



**Gava Mendes**

*Clínica Médica*

**Dr. João Marcos Rezende Mendes**

*Especialista e Titular pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED)*

*Especialista e Titular pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG)*

*Especialista em Cirurgia Geral pela Associação Médica Brasileira (AMB)*

Nome: \_\_\_\_\_

### Orientações pós retirada do Balão Intragástrico (BI)

#### Uso Oral

1. Domperix ----- 10mg ----- 01 caixa  
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 3 dias
2. Vonau Flash ----- 8mg ----- 01 caixa  
Deixar o comprimido dissolver na boca de 12/12h horas se houver enjôo ou vômitos mesmo após o uso de domperix.
3. Dexilan-----t ----- 60mg ----- 01 caixa  
Tomar 1 comprimido 1x por 7 dias

#### Orientações

- Manter as consultas com a equipe de nutricionistas, isso é muito importante para a continuidade do seu tratamento.
- Manter atividade física regular!
- Se necessário entre em contato diretamente conosco pelos dados abaixo.

Agradecemos por ter feito parte dessa etapa da sua vida!

**Gava Mendes**

*Clínica Médica*